

Idealan partner protiv širokog spektra širokolisnih korova u žitaricama

Ekonomičan herbicid širokog vremena primjene za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama. Sadrži dvije aktivne tvari: diflufenikan 500 g/l i florasulam 50 g/l.

PRIMJENA

- ✓ **U jesen** od kraja nicanja do faze kad su uočljiva dva bočna izdanka (BBCH 12-22), u dozi 75 ml/ha.
- ✓ **U proljeće** do faze kada je drugo koljenice 2 cm iznad prvog (BBCH 32), u dozi 100 ml/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA

Poljski jarmen, rusomača, obični šupljizub, ljepeljiva broćika, bezmirisna kamilica, poljska potočnica, poljski mak, poljska gorušica, obična mišjakinja, poljska čestika, bršljenasta čestoslavica, perzijska čestoslavica, poljska ljubica, bijela loboda, razlićak, mrtva kopriva i dr.

PREDNOSTI

- ✓ **Djelovanje** na najvažnije širokolisne korove u žitaricama **preko lista i preko tla**.
- ✓ **Najduža primjena**, od kraja nicanja do drugog koljenca.
- ✓ **Mala doza** sredstva po hektaru.
- ✓ Kombinacija sa herbicidom FILON® 80 EC cjelovito je rješenje za rano uklanjanje korova.
- ✓ Mogućnost odvojene **primjene u proljeće**.
- ✓ **Nije potrebno dodavati okvašivač**.



Najbolji učinak se postiže tretiranjem ranog stadija razvoja korova, **stadij nicanja do faze kada korovi razviju 2-3 lista**. **Temperatura:** tretirati između 5 °C i 25 °C (noćna temperatura ne smije pasti ispod 0 °C).



Axial® 50 EC

AXIAL® 50 EC vrhunski herbicid koji se primjenjuje u pšenici i ječmu protiv uskolisnih korova.

U sastavu ima ugrađeni okvašivač zbog kojeg osigurava visoki učinak na uskolisne korove u žitaricama kao što su slakoperka, ljuljevi, divlja zob, mišji repak i brojni drugi.

Djeluje preko lista zbog čega vlaga u tlu ima minimalan utjecaj na djelotvornost ovog herbicida.

AXIAL® 50 EC je najbolje primijeniti nakon nicanja korova kada je najučinkovitiji na najvažnije tvrdokorne uskolisne korove.

