

Hrvatska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.hr>)

Početna > Fusilade forte

Fusilade forte



Fusilade forte

Zadnja promjena:

29.06.2017

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number:

UP/I-320-20/00-01/164

Sastav:

150 g/l

Fluazifop-p-butyl

Kemijska skupina

ACCase inhibitori

Grupa:

Grupa A

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

Način djelovanja:

Sistemično

FUSILADE FORTE je selektivni herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, krumpiru, luku.

Zbog svoje selektivnosti i učinkovitosti spada među najprodavanije graminicide na svijetu.

Fusilade Forte se apsorbira u biljku preko listova, zatim se razmješta u točke rasta gdje spriječava rast i razvoj korova. Specifična formulacija pripravka Fusilade Forte omogućava vrlo brzo upijanje pa oborine već 2 sata nakon primjene neće umanjiti efikasnost pripravka. Korovske biljke ubrzo nakon aplikacije prestaju s rastom, dok konačno ugibanje nastupi 14 – 21 dan nakon aplikacije.

Product CP: Tabs

- [Registracija](#)
- [Mjere sigurnosti](#)
- [Preporuke](#)
- [Other](#)

Filtriraj prema kulturi

- Bilo koja - ▼

Apply

Celer

Krumpir

Luk

Peršin

Šećerna repa

Soja

Suncokret

Uljana repica

Zaštita okoliša

- Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Kod primjene spriječiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotoka i mora, radeći najmanje 20 m udaljeno od istih. Ostatke škropiva ne ispuštati u kanale i kanalizaciju.

Zaštitna oprema

- Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću (dugi rukavi), plastične ili gumene rukavice, zaštitne naočale ili vizir te protuprašinsku filtarsku polumasku

Miješanje

Ne preporuča se miješati ga sa drugim herbicidnim pripravcima jer se javlja antagonizam i opada učinak na višegodišnje trave.

Utrošak vode

200-400 l/ha

Ograničenja

Ne tretirati pri temperaturi tla i zraka ispod 10 °C.

Sredstvo se smije primijeniti samo u luku za proizvodnju glavica.

Soja se smije tretirati samo prije početka cvatnje.

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Zabranjena primjena u kupusu.

Na istoj površini u punoj dozi smije se primijeniti samo jedan put godišnje.

Plodored

Najranije 70 dana iza tretiranja mogu se u plodoredu sijati žitarice i kukuruz.

- Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u **šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, krumpiru i luku**. Ovisno o vrsti korova, sredstvo se primjenjuje u slijedećim dozama:

- 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml/100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova koštana (*Echinochloa crus-galli*), muharika (*Setaria* spp.), svračice (*Digitaria sanguinalis*), divljeg prosa (*Panicum* spp.) i dr. u stadiju 2-4 lista;

- 1,3-1,5 l/ha (13-15 ml/100m²), za suzbijanje divljeg sirka (*Sorghum halapense*) u stadiju 15-20 cm visine korova,

U šećernoj repi, suncokretu i uljanoj repici:

- 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml/100 m²) za suzbijanje pirike (*Agropyron repens*) u stadiju 10-20 cm visine korova,

- 2,0 l/ha (20 ml/100 m²) za suzbijanje zubače (*Cynodon dactylon*) u stadiju 10-15 cm visine korova.

U soji, krumpiru i luku:

- 1,5-1,6 l/ha (15-20 ml/100 m²) za suzbijanje pirike (*Agropyron repens*) u stadiju 10-20 cm visine korova.

Niže količine primjene djelotvorne su kod primjene na korove u preporučenim stadijima razvoja i u aktivnom rastu. Smanjena količina vlage tla i zraka (korovi u suši), kao i veći razvojni stadiji korova, smanjuju djelotvornost sredstva, pa je potrebno primijeniti više preporučene doze. Za bolje suzbijanje višegodišnjih korova preporuča se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma. U povrtnim kulturama ne preporuča se razdvojena primjena zbog produženja perzistentnosti.

Karenca: 49 dana za luk, 56 dana za šećernu repu, 75 dana za soju, 90 dana za suncokret, uljanu repicu i krumpir

