

U Zagrebu, 30.01.2017.

PREDMET: Obavijest o izmjeni rješenja o dozvoli uslijed izmjene maksimalno dozvoljenih količina ostataka (rezidua) za sredstva za zaštitu bilja: VERTIMEC 018 EC, PIRIMOR 50 WG, CHORUS 75 WG SWITCH 62,5 WG, FUSILADE FORTE, REGLONE FORTE.

Poštovani,

želimo Vas obavijestiti da je određenim sredstvima tvrtke Syngenta došlo do izmjene primjene te je sukladno izmjenama navedenim u tablicama koje slijede, potrebno provesti preetiketiranje.

Zbog novo određenih maksimalno dozvoljenih količina ostataka (MDK) izmjenjena je primjena sredstvima: VERTIMEC 018 EC, PIRIMOR 50 WG, CHORUS 75 WG, SWITCH 62,5 WG, FUSILADE FORTE i REGLONE FORTE (Tablica 1). **Molimo Vas da kupce sredstava također upozorite da i vlastite zalihe navedenih sredstava moraju primjenjivati prema novoj registraciji kako ne bi prekoračili propisane nove MDK vrijednosti!**

Da bi Vama bilo lakše proučiti izmjene i davati savjete, u tablicama se nalazi izmjenjeni tekst dijelova etikete navedenih sredstava. U slučaju bilo kakvih daljnjih izmjena, naknadno ćemo Vas obavijestiti.

Još jednom ističemo da se zbog ukidanja rješenja o dozvoli za primjenu iz prodaje i primjene povlače sredstva LOGRAN 20 WG i LINTUR 75 WG (Tablica 2.).

U dolje navedenim tablicama ćete naći detaljne informacije o izmjenama, rokovima, te za koje pripreme treba provesti preetiketiranje.

Molimo Vas da nam javite slijedeće podatke o postojećim zalihama navedenih sredstava do 06.02.2017.:

| | |
|---------------------|--|
| Tvrtka i adresa: | Naziv tvrtke (adresa tvrtke i kontakt osoba) |
| Naziv sredstva: | Naziv sredstva |
| Veličina pakiranja: | 500 gr ili 1 l i sl. |
| Broj komada: | Npr. 10 |

Podatke kao i sve eventualne upite molimo Vas šalјite na e-mail adresu:

Etikete.HRZA@syngenta.com ili na faks broj: 01/3887671.

Srdačan pozdrav,
Syngenta Agro d.o.o.

Tablica 1. IZMJENA RJEŠENJA SUKLADNO IZMJENI MDK (maksimalno dozvoljenih količina ostataka) sukladno Uredbi 396/2005¹ i Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 (NN 80/2013)²

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | IZMJENJENI TEKST ETIKETE – PRIMOR 50 WG Sve ostalo u postojećoj etiketi ostaje nepromijenjeno i na snazi | Napomena o prodaji zaliha |
|------------------------------|---------------------------|----------------|--|--|
| PRIMOR 50 WG (pirimikarb) | 525-09/0727-16-2 | 29.9.2016. | <p>- točka 3. izrijeka rješenja mijenja se te sada glasi: „3. Primjena: Selektivni insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih uši (<i>Aphididae</i>) na: - jezgričavim vočkama (jabuka, kruška), koštičavim vočkama (višnja, breskva, šljiva) i ukrasnom bilju u koncentraciji sredstva 0,04-0,06 % (4-6 g u 10 l vode, tj. 40-60 g u 100 l vode) uz maksimalan utrošak 1200 l/ha vode; - grašku, grahu, mrkva, salati i jagodi (na otvorenom prostoru), u koncentraciji sredstva 0,04-0,06 % (4-6 g u 10 l vode, tj. 40-60 g u 100 l vode) uz maksimalan utrošak 1000 l/ha vode; - rajčici, krastavcu i paprici, (na otvorenom prostoru), u koncentraciji sredstva 0,04-0,06 % (4-6 g u 10 l vode, tj. 40-60 g u 100 l vode) uz maksimalan utrošak 400-1000 l/ha vode - šećernoj repi u količini 300 g/ha (30 g na 1000 m²) i žitaricama (pšenica, ječam, zob) u količini 260 g/ha (26 g na 1000 m²) uz utrošak 200-400 l/ha vode.“;</p> <p>- točka 4. izreke rješenja mijenja se, te sada glasi: „ 4. Ograničenja: Ne smije se primjenjivati na kulturama u zaštićenom prostoru. Tijekom iste vegetacije na istoj površini ili nasadu smije se primijeniti najviše: - jedan puta: na rajčici, šećernoj repi, jezgričavim vočkama (jabuka, kruška), koštičavim vočkama (višnja, breskva, šljiva), jagodi, krastavcu, grašku, grahu, mrkvi, salati i paprici; - dva puta: na žitaricama. Primjena iz zraka nije dopuštena.“;</p> <p>- točka 6. izreke rješenja mijenja se, te sada glasi: „6. Karence: 7 dana: za rajčicu, krastavac, 14 dana: za jabuke, kruške, višnju, jagodu, grašak, grah, mrkva, salatu, i papriku, 21 dan: za šećernu repu; 28 dana: za breskvu i šljivu; 35 dana: žitarice. Nije primjenjiva za ukrasno bilje“</p> | Primjenjivo odmah. POTREBNO PREETIKETIRATI. Molimo javiti zalihe (broj prema veličini pakiranja) |

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | IZMJENJENI TEKST ETIKETE – CHORUS 75 WG Sve ostalo u postojećoj etiketi ostaje nepromijenjeno i na snazi | Napomena o prodaji zaliha |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|
| CHORUS 75 WG (ciprodinil) | 525- 09/0727- 16-2 | 25.11.2016. | <p>- točka 3. izrijeke rješenja mijenja se te sada glasi: „3. Primjena: Fungicid za suzbijanje bolesti: 3.1. krastavosti plodova jabuke (<i>Venturia inaequalis</i>), primjenom do precvjetavanja, preventivno, u koncentraciji sredstva od 0,02% (20 g u 100 l vode) i preventivno nakon cvatnje u koncentraciji sredstva 0,02-0,03% (20-30 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l vode/ha. Dozvoljena su tri tretiranja u razmacima 7-10 dana.</p> <p>3.2. na vinovoj lozi (vinske sorte) za suzbijanje sive plijesni vinove loze (<i>Botrytis cinerea</i>), u količini sredstva 400-600 g/ha; 3.2.1. na vinovoj lozi (stolne sorte) za suzbijanje sive plijesni vinove loze (<i>Botrytis cinerea</i>), u količini sredstva 400-500 g/ha. Sredstvo se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji: prvi puta krajem cvatnje (kada je 80% cvatnje završeno), a drugi puta prije zatvaranja grozda.</p> <p>3.3. na višnji za suzbijanje paleži cvjetova i sušenja grančica (<i>Monilinia laxa</i>), u količini sredstva 300-400 g/ha (30-40 g na 1000 m²). Tretiranja provoditi u punoj cvatnji i precvjetavanju.“;</p> <p>- točka 4. izreke rješenja mijenja se, te sada glasi: „4. Ograničenja: Sredstvo se smije primijeniti najviše tri puta godišnje u istom nasadu jabuke, dva puta u nasadu vinove loze i višnje. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.“;</p> <p>- točka 5. izreke rješenja mijenja se, te sada glasi: „5. Karenca: 14 dana za višnje, 21 dan za vinovu lozu (vinske i stolne sorte) i 35 dana za jabuku.“</p> | <p>Primjenjivo odmah. POTREBNO PREETIKETIRATI. Molimo javiti zalihe (broj prema veličini pakiranja)</p> |

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | IZMJENJENI TEKST ETIKETE – SWITCH 62,5 WG Sve ostalo u postojećoj etiketi ostaje nepromijenjeno i na snazi | Napomena o prodaji zaliha |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--|
| Switch 62,5 WG (ciprodinil) | Rješenje u izradi | | <p>- točka 3. mijenja se te sada glasi: „3. Primjena: Kombinirani fungicid za suzbijanje: 3.1. sive plijesni (<i>Botrytis cinerea</i>) na vinovoj lozi, primjenom u koncentraciji od 0,08% (80 g u 100 l vode), uz utrošak škropiva od 1000 l/ha. Prvi puta se primjenjuje u vrijeme cvatnje, te kada dolazi do promjene boje i mekšanja bobica. Prilikom mješanja prvo se napravi homogena suspenzija Switcha 62,5 WG. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje u istom vinogradu. 3.2. kombinirani fungicid za suzbijanje sive plijesni (<i>Botrytis cinerea</i>) na jagodama, u količini od 1 kg/ha uz utrošak od 1000 l vode/ha (100 g u 100 l vode na 1000 m², odnosno, 10 g sredstva na 100 m²). Smije se najviše dva puta koristiti, od početka do kraja cvatnje. 3.3. paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.) na marelici u količini od 60 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 10-14 dana. 3.4. paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.) na trešnji u količini od 80 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha; 3.5. paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.) na šljivi u količini od 80 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha; 3.6. paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.) na breskvi i nektarini u količini od 80-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha; 3.7. smeđa pjegavost kruške (<i>Stemphylium vesicarium</i>) na kruški u količini od 80 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha; 3.8. sive truleži (<i>Botrytis cinerea</i>) i bijele truleži (<i>Sclerotinia</i> spp.) na rajčici i paprici u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha; Za sve namjene, gdje to nije posebno navedeno, potrebno je prilagoditi količinu vode po jedinici površine (1 ha) tako da se ne prekorače maksimalno dozvoljene količine sredstva.“</p> <p>-točka 5. mijenja se te sada glasi: „5. Karenca: 21 dan za vinovu lozu; 14 dana za kruške; 7 dana za jagode, marelice, trešnje, šljive, breskve, nektarine i papriku; 3 dana za rajčicu“</p> | <p>Primjenjivo odmah. POTREBNO PREETIKETIRATI. Molimo javiti zalihe (broj prema veličini pakiranja)</p> |

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | IZMJENJENI TEKST ETIKETE – FUSILADE FORTE Sve ostalo u postojećoj etiketi ostaje nepromijenjeno i na snazi | Napomena o prodaji zaliha |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| FUSILADE FORTE (fluazifop-p-butil) | Rješenje u izradi | | <p>- točka 3. izrijeke rješenja mijenja se i glasi: „ Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, krumpiru i luku. Ovisno o vrsti korova, sredstvo se primjenjuje u slijedećim dozama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šećernoj repi, suncokretu i uljanoj repici: <ul style="list-style-type: none"> o 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml/100 m²) za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova poput koštana (<i>Echinochloa crus-galli</i>), muharika (<i>Setaria spp.</i>), svračice (<i>Digitaria sanguinalis</i>), divljeg prosa (<i>Panicum spp.</i>) i dr. u stadiju 2-4 lista, o 1,3-1,5 l/ha (13-15 ml/100 m²) za suzbijanje divljeg sirka (<i>Sorghum halepense</i>) u stadiju 15-20 cm visine korova, o 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml/100 m²) za suzbijanje pirike (<i>Agropyron repens</i>) u stadiju 10-20 cm visine korova, o 2,0 l/ha (20 ml/100 m²) za suzbijanje zubače (<i>Cynodon dactylon</i>) u stadiju 10-15 cm visine korova. - soji, krumpiru i luku: <ul style="list-style-type: none"> o 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml/100 m²) za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova o 1,3-1,6 l/ha (13-16 ml/100 m²) za suzbijanje višegodišnjih travnih korova. <p>Niže količine primjene djelotvorne su kod primjene na korove u preporučenim stadijima razvoja i u aktivnom rastu. Smanjena količina vlage tla i zraka (korovi u suši), kao i veći razvojni stadiji korova, smanjuju djelotvornost sredstva, pa je potrebno primjeniti više preporučene doze.</p> <p>Za bolje suzbijanje višegodišnjih korova preporuča se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma.</p> <p>U povrtnim kulturama ne preporuča se razdvojena primjena zbog produženja perzistentnosti.“</p> <p>- točka 5. izrijeke rješenja mijenja se i glasi: „5. karence: - 49 dana za luk - 56 dana za šećernu repu - 75 dana za soju - 90 dana za suncokret, uljanu repicu i krumpir“</p> <p>ZABRANJENA PRIMJENA U KUPUSU.</p> | <p>Primjenjivo odmah. POTREBNO PREETIKETIRATI. Molimo javiti zalihe (broj prema veličini pakiranja)</p> |

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | IZMJENJENI TEKST ETIKETE – REGLONE FORTE Sve ostalo u postojećoj etiketi ostaje nepromijenjeno i na snazi | Napomena o prodaji zaliha |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|
| REGLONE FORTE (dikvat) | Rješenje u izradi | | <p>- točka 3. izrijeka rješenja mijenja se i glasi:</p> <p>„ Neselektivni kontaktni herbicid – desikant za:</p> <p>3.1. desikaciju cime sjemenskog i merkantilnog krumpira u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u količini 4-5 l/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha (400-500 ml u 40-50 l vode na 1000 m²);</p> <p>Cima se ne smije prije primjene mehanički oštetiti jer su u protivnom ostaci sredstva u gomolju viši od MDK. Desikacija se ne smije obavljati ako je tlo izrazito suho, tj. kada je kod krumpira došlo do gubitka turgora, jer može doći do oštećenja gomolja (odumiranje vriježa).</p> <p>3.2. desikaciju suncokreta, soje i uljane repice u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u količini 2,5-3,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (250-350 ml u 40-60 l vode na 1000 m²);</p> <p>3.3. desikaciju sjemenske lucerne i sjemenske djeteline u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u količini 5-6 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (500-600 ml u 40-60 l vode na 1000 m²);</p> <p>3.4. za usmjereno suzbijanje korova u višegodišnjim nasadima samo viših uzgojnih oblika: voćnjacima (jabuka, kruška, dunja, mušmula, nešpula, marelica, trešnja, breskva, šljiva, agrumi (grejp, naranča, limun, limeta mandarina) i vinogradima (vinske i stolne sorte), u količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m²), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine.</p> <p>Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.</p> <p>„5. karence:</p> <p>3 dana prije žetve za lucernu i djetelinu, 5 dana prije kombajniranja za uljanu repicu, suncokret i soju, 10 dana za vađenje krumpira i 30 dana za ispašu, voćke i vinovu lozu. Slama nakon desikacije ne smije se koristiti za ishranu i stelju domaćih životinja. Sačma uljane repice može se koristiti za ishranu domaćih životinja.“</p> | <p>Primjenjivo odmah.</p> <p>POTREBNO PREETIKETIRATI.</p> <p>Molimo javiti zalihe (broj prema veličini pakiranja)</p> |

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | IZMJENJENI TEKST ETIKETE – VERTIMEC 018 EC Sve ostalo u postojećoj etiketi ostaje nepromijenjeno i na snazi | Napomena o prodaji zaliha |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|
| VERTIMEC 018 EC (abamektin) | 525- 09/0727- 16-4 | 16.9.2016. | <p>- točka 3. izrijeke rješenja mijenja se i glasi: „ Kontaktni akaricid i insekticid koji se primjenjuje za zaštitu:</p> <p>3.1. jabuke i kruške za suzbijanje: - lisne buhe (<i>Psylla</i> spp.) u količini 0,75-1,5 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica ili na novim generacijama kod pojave prvih ličinki; - crvenog voćnog pauka (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivine grinje (<i>Tetranychus urticae</i>), hrđaste grinje (<i>Aculus</i> spp.), lisnog minera okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>) i moljca točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>) u količini 0,75-1,0 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;</p> <p>3.2. naranče, mandarine, klementine i limuna za suzbijanje: - lisnog minera agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>) u količini od 0,375-0,75 l/ha (37,5 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih mina na mladima u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. U koliko se sredstvo primjenjuje jedanput količina je 0,75 l/ha (75 ml/100 l vode); - koprivine grinje (<i>Tetranychus urticae</i>) i crvenog pauka agruma (<i>Panonychus citri</i>) u količini 0,75-1,0 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod prvih pokretnih stadija. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;</p> <p>3.3. vinove loze za suzbijanje: - crvenog voćnog pauka (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivine grinje (<i>Tetranychus urticae</i>) i žutog lozinog pauka (<i>Eotetranychus carpini</i>) u količini 0,75 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% lišća; - pepeljastog groždanog moljca (<i>Lobesia botrana</i>) i žutog groždanog moljca (<i>Eupoecilia ambiguella</i>) u količini 0,5-0,75 l/ha (55 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje od polaganja prvih jaja do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja;</p> <p>3.4. breskve i nektarine za suzbijanje: - crvenog voćnog pauka (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivine grinje (<i>Tetranychus urticae</i>), eriofidne grinje (<i>Aculus fockeui</i>) u količini od 0,75-1,1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija. - ličinki resičara (<i>Thrips</i> spp., <i>Taeniothrips</i> spp., <i>Frankliniella</i> spp.) u količini 0,75-1,1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih simptoma oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretiranje u ljeti preporuča se dodati mineralno ulje (0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva;</p> | <p>Primjenjivo odmah. POTREBNO PREETIKETIRATI. Molimo javiti zalihe (broj prema veličini pakiranja)</p> |

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | IZMJENJENI TEKST ETIKETE – VERTIMEC 018 EC (nastavak) Sve ostalo u postojećoj etiketi ostaje nepromijenjeno i na snazi | Napomena o prodaji zaliha |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | <p>3.5. maline i kupine za suzbijanje: - crvenih pauka (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.) u količini 0,75-1,2 l/ha (75-100 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;</p> <p>3.6. rajčice, paprike, krastavaca, dinje i lubenice na otvorenom i u zaštićenom prostoru za suzbijanje: - crvenog pauka (<i>Tetranychus</i> spp.) i hrđaste grinje rajčice (<i>Aculus lycopersici</i>) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija; - ličinki resičara (<i>Frankliniella</i> spp.) u količini 0,75-1,2 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje prilikom pojave prvih ličinki; - lisnih minera (<i>Liriomyza</i> spp.) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana;</p> <p>3.7. salate i rukole na otvorenom prostoru za suzbijanje: - lisnih minera (<i>Liriomyza</i> spp.) i ličinki resičara (<i>Frankliniella</i> spp.) u količini 0,3-1,0 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primjenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.</p> <p>3.7.1. salate u zaštićenom prostoru za suzbijanje : - lisnih minera (<i>Liriomyza</i> spp.) i ličinki resičara (<i>Frankliniella</i> spp.) u količini 0,3-0,5 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primjenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.</p> <p>Za sve namjene potrebno je prilagoditi količinu vode po jedinici površine (1 ha) tako da se ne prekorače maksimalne dozvoljene količine sredstva.“;</p> <p>- točka 5. izreke rješenja mijenja se, te sada glasi: „3 dana za dinju, lubenicu, krastavce i papriku; 7 dana za rajčicu, maline i kupine; 10 dana za naranče, mandarine, klementine i limun; 14 dana za breskve, nektarine, salatu i rukolu; 28 dana za jabuke, kruške i vinovu lozu“</p> | |

¹Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

²Zakon o provedbi uredbe (ez) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013)

Tablica 2. UKIDANJE RJEŠENJA O DOZVOLI ZA PROMET

| Pripravak (djelatna tvar) | Ur. broj izmjene rješenja | Datum rješenja | Napomena o izmjeni (obavezno provjeriti etiketu) | Napomena o prodaji zaliha |
|---------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
| LOGRAN 20 WG ³ | 525-09/0794-16-15 | 24.8.2016. | <ul style="list-style-type: none"> • Prestanak valjanosti rješenja o dozvoli stupa na snagu 30.9.2016. | Prodaja zaliha dozvoljena do 31.03.2017. Primjena krajnjih korisnika dozvoljena do 30.9.2017. |
| LINTUR 75 WG ³ | 525-09/0794-16-2 | 17.8.2016. | <ul style="list-style-type: none"> • Prestanak valjanosti rješenja o dozvoli stupa na snagu 30.9.2016. | Prodaja zaliha dozvoljena do 31.03.2017. Primjena krajnjih korisnika dozvoljena do 30.9.2017. |

³Provedbena Uredba komisije (EU) b 2016/864 od 31. svibnja 2016. o neobnavljanju odobrenja za aktivnu tvar triasulfuron u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.