

Poljoprivredne ljekarne

U Zagrebu, 23.05.2023.

PREDMET: Obavijest o izmjeni rješenja sredstva za zaštitu bilja Vertimec 018 EC uslijed izmjene maksimalno dozvoljenih količina ostataka (rezidua) aktivne tvari abamektin

Poštovani,

obavještavamo Vas da je slijedom Uredbe (EU) 2023/198 od o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin u ili na određenim proizvodima došlo do izmjene MDK vrijednosti za aktivnu tvar *abamektin* te je kod sredstva **Vertimec 018 EC** tvrtke **Syngenta Crop Protection AG** došlo do izmjene rješenja o registraciji (Klasa: UP/I-320-20/06-01/27, Urbroj: 525-06/248-23-14, od 23. svibnja 2023. godine).

Prema novom rješenju Ministarstva poljoprivrede sredstvo za zaštitu bilja Vertimec 018 EC **ne smije** se primjenjivati u **rukoli, te je došlo do izmjena u primjeni i u drugim kulturama** (jabuka, kruška, rajčica, paprika, krastavci, salata, malina, kupina, dinja, lubenica). Slijedom toga u Privitku 1 ovog dopisa prilažemo novi tekst etikete s **označenim** kulturama u kojima je došlo do izmjena.

Ljubazno Vas molimo da se tijekom primjene pridržavate nove registracije budući da se sredstvo za zaštitu bilja Vertimec 018 EC više ne smije primijenjivati prema "staroj" etiketi!

Molimo Vas da nam javite podatke o trenutnim količinama **do 31.05.2023.** na način da popunite tablicu koju šaljem uz dopis u priritku, te je popunjenu povratno pošaljete na email **Etikete.HRZA@syngenta.com**. Ukoliko ne dostavite podatke o količinama u navedenom roku, smatrat ćemo da takvih zaliha nema.

Također Vas molimo da obavijestite sve svoje kupce u lancu kako bi bili sigurni da je informacija stigla do svakog maloprodajnog subjekta i krajnjeg korisnika.

Eventualne upite slobodno nam uputite na mail adresu: **Etikete.HRZA@syngenta.com**.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,
Syngenta Agro d.o.o.



Privitak 1: Detalji o primjeni sredstva za zaštitu bilja Vertimec 018 EC:

Kontaktini akaricid i insekticid koji se primjenjuje za zaštitu:

3.1. jabuke i kruške za suzbijanje:

- lisne buhe (*Psylla* spp.) u količini 0,72 L/ha (72 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica ili na novim generacijama kod pojave prvih ličinki;
- crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*), koprivine grinje (*Tetranychus urticae*), hrđaste grinje (*Aculus* spp.), lisnog минера okruglih mina (*Leucoptera malifoliella*) i moljca točkastih mina (*Phyllonorycter blancardella*) u količini 0,72 L/ha (72 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;
Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne primjene iznosi 0,72 L/ha. Smije se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji uz vremenski razmak od 7 dana između primjena;

3.2. naranče, mandarine, klementine i limuna za suzbijanje:

- lisnog минера agruma (*Phyllocnistis citrella*) u količini od 0,375-0,75 L/ha (37,5 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih mina na mladima u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. U koliko se sredstvo primjenjuje jedanput količina je 0,75 L/ha (75 ml/100 L vode);
- koprivine grinje (*Tetranychus urticae*) i crvenog pauka agruma (*Panonychus citri*) u količini 0,75-1,0 L/ha (75 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod prvih pokretnih stadija. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;

3.3. vinove loze za suzbijanje:

- crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*), koprivine grinje (*Tetranychus urticae*) i žutog lozinog pauka (*Eotetranychus carpini*) u količini 0,75 L/ha (75 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% lišća;
- pepeljastog groždanog moljca (*Lobesia botrana*) i žutog groždanog moljca (*Eupoecilia ambiguella*) u količini 0,5-0,75 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od polaganja prvih jaja do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja. Smije se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji uz vremenski razmak od 14 dana između primjena;

3.4. breskve i nektarine za suzbijanje:

- crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*), koprivine grinje (*Tetranychus urticae*), eriofidne grinje (*Aculus fockeui*) u količini od 0,75-1,1 L/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
- ličinki resičara (*Thrips* spp., *Taeniothrips* spp., *Frankliniella* spp.) u količini 0,75-1,1 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih simptoma oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretiranje u ljeti preporuča se dodati mineralno ulje (0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva;

3.5. maline (na otvorenom) i kupine (na otvorenom) za suzbijanje:

- crvenih pauka (*Tetranychus* spp., *Panonychus* spp.) u količini 0,75-1,2 L/ha (75-100 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija. Smije se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji uz vremenski razmak od 7 do 10 dana između primjena;

3.6. dinje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i lubenice (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje:

- crvenog pauka (*Tetranychus* spp.) i hrđaste grinje rajčice (*Aculus lycopersici*) u količini 0,3-1,2 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
- ličinki resičara (*Frankliniella* spp.) u količini 0,75-1,2 L/ha (75 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje prilikom pojave prvih ličinki;
- lisnih minera (*Liriomyza* spp.) u količini 0,3-1,2 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana;

3.7. paprike (u zaštićenom prostoru), krastavaca (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje:

- crvenog pauka (*Tetranychus* spp.) i hrđaste grinje rajčice (*Aculus lycopersici*) u količini 0,3-1,2 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
- ličinki resičara (*Frankliniella* spp.) u količini 0,75-1,2 L/ha (75 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje prilikom pojave prvih ličinki;
- lisnih minera (*Liriomyza* spp.) u količini 0,3-1,2 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana;

3.8. rajčice (na otvorenom) za suzbijanje:

- crvenog pauka (*Tetranychus* spp.) i hrđaste grinje rajčice (*Aculus lycopersici*) u količini 0,3-1,2 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
- ličinki resičara (*Frankliniella* spp.) u količini 0,75-1,2 L/ha (75 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje prilikom pojave prvih ličinki;
- lisnih minera (*Liriomyza* spp.) u količini 0,3-1,2 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana;

3.9. rajčice (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje:

- crvenog pauka (*Tetranychus* spp.) i hrđaste grinje rajčice (*Aculus lycopersici*) u količini 0,3-1,0 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
- ličinki resičara (*Frankliniella* spp.) u količini 0,75-1,0 L/ha (75 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje prilikom pojave prvih ličinki;
- lisnih minera (*Liriomyza* spp.) u količini 0,3-1,0 L/ha (60 ml/100 L vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana;

4.0. salata (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje:

- lisnih minera (*Liriomyza* spp.) i ličinki resičara (*Frankliniella* spp.) u količini 0,3-0,5 L/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primjenjuje se od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja. Smije se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji uz vremenski razmak od najmanje 7 dana između primjena

Za sve namjene potrebno je prilagoditi količinu vode po jedinici površine (1 ha), utrošak vode je maksimalno 1000 L/ha, tako da se ne prekorače maksimalne dozvoljene količine sredstva.

Karenca: 3 dana za dinju (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), lubenicu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), krastavce (u zaštićenom prostoru), rajčica (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i papriku (u zaštićenom prostoru); 7 dana maline (na otvorenom) i kupine (na otvorenom); 10 dana za naranče, mandarine, klementine i limun; 14 dana za breskve, nektarine, salatu (u zaštićenom prostoru); 28 dana za jabuke, kruške i vinovu lozu.